

## DESCRIPCIÓN

**TALON® BLOQUES** es un poderoso rodenticida anticoagulante de segunda generación, de dosis única, que controla eficazmente ratones o lauchas, ratas del tejado y guarenes, incluso aquellos resistentes a los rodenticidas de uso común.

**TALON® BLOQUES** mata a los roedores con la primera dosis que ingieren y no produce rechazo al cebo, ya que la muerte de los roedores ocurre 2 a 5 días después de su ingesta.

**TALON® BLOQUES** contiene **BITREX®**, amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso y no siendo detectado por los roedores.

## RECOMENDACIONES DE USO

- **TALON® BLOQUES** es un raticida listo para usar (cebo), especialmente indicado para el control de roedores en casas, bodegas, industrias, planteles animales y otras instalaciones
- Aplicar **TALON® BLOQUES** tan pronto se observen las primeras señales de los roedores (fecas, huellas, roeduras, manchas, etc.).
- Utilizar el orificio central de los bloques para colgarlos o fijarlos (ej. *caja cebadora o tubo de PVC*), en todos los lugares donde los roedores circulen, viven y alimenten (alcantarillado, canales de desagüe, vigas, jardines, árboles, madrigueras). En el caso de los bloques de 5 gramos amarrarlos por el contorno de éste.
- En caso de nuevos roedores repita la aplicación cada 7 ó 14 días hasta que cese el consumo.
- Para prevenir una nueva infestación, es posible mantener algunos puntos permanentes con **TALON® BLOQUES** (*puntos críticos*), sólo si es estrictamente necesario y revisarlos periódicamente para detectar si hay consumo.

### Cuadro de Recomendaciones de uso para Bloques de 20 gramos

Ratas y Guarenes: <b>Colocar 1 - 2 bloques cada 5 a 10 metros</b>
Lauchas o Ratones: <b>Colocar 1 bloque cada 3 a 6 metros</b>

### Cuadro de Recomendaciones de uso para Bloques de 5 gramos

Ratas y Guarenes: <b>Colocar 2 - 4 bloques cada 5 a 10 metros</b>
Lauchas o Ratones: <b>Colocar 2 bloques cada 3 a 6 metros</b>

- Si la infestación es alta utilice distancia menor de ubicación señalada en el cuadro anterior.
- Complemente el uso de **TALON® BLOQUES** con una correcta limpieza y aseo del lugar.
- Para interiores o ambientes secos, prefiera **TALON® Pellets**.

**RATICIDA EN BLOQUES**



**Talon<sup>®</sup> Bloques 0,005%**

**PROFESIONAL**

**TALON BLOQUES 0,005%**

**PRODUCTO GOLD**

**COMPOSICIÓN**

Cada 100 g contiene:

Brodifacoum CAS 56073-10-0.....	0,005 g
Bitrex*.....	0,001 g
Derivados de cereales c.s.p.....	100 g

\* Benzoato de denatonium.



**LISTO PARA USAR EN EXTERIORES O LUGARES HUMEDOS**

**ELIMINA  
RATAS  
Y RATONES**



Contenido Neto:



**syngenta**

**PRODUCTO DE BANDA VERDE**  
**Cuidado**

**Grupo químico: Hidroxicumarinas.**  
**Clase Toxicológica OMS: IV (Cuidado). Producto de Banda Verde.**  
**Condición de venta: Especializada (Uso Profesional)**

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Conservar **TALON® BLOQUES** en su envase original.
- Usar guantes para su manipulación.
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
- Enterrar o eliminar los roedores muertos y cebo no consumido.
- Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.
- Mantener fuera del alcance de los niños y/o personas no responsables.
- Mantener lejos del alcance de aves y animales.
- No colocar cebo en áreas que están en contacto con alimentos o sean accesibles para niños o animales domésticos.
- No almacenar junto con alimentos o forrajes.
- En caso de envenenamiento llamar a un médico.
- Riesgo Ambiental: Tóxico para peces, crustáceos y aves. No eliminar a cursos o fuentes de aguas.
- Manejo de envases vacíos: Incineración y/o eliminación en instalaciones autorizadas.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, **NO** provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico **CITUC al fono: +56 2 2635 3800, las 24 horas.**
- **SIGNOS DE INTOXICACIÓN:** después de una ingesta accidental pueden aparecer hasta varios días después hemorragias de intensidad variable.

#### ANTIDOTO

- **Vitamina K1 (Fitomenadiona) oral o inyectable. Adultos 40 mg /día. Niños: 20 mg /día (ambos en varias dosis hasta que el tiempo de protrombina vuelva a la normalidad).**

En caso de INTOXICACION, llamar a:

- **Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): 2 2 2635 3800**
- **Syngenta S.A. (horario de oficina): 2 2 2941 0100**



**LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y MASCOTAS**

**Consultas al Fono 2 2941 0100 o al mail: [soluciones.profesionales@syngenta.com](mailto:soluciones.profesionales@syngenta.com)**

Codigo de Barra:

Lote / Vencimiento

**Fabricado por:** Server Quimica Ltda., Av. Norberto de Carvalho, nº1473 - Bloco 7B - Lorenzetti - Vera Cruz - SP - CEP: 17560-000, Brasil

**Importado y distribuido por:** Syngenta S.A., Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes, Santiago.

**Registro ISP N° P-609/21**

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

**Bitrex®** es marca registrada de Mac-Farland Smith, Inglaterra.