



Raticida Bloques Piramidales

Composición

Bromadiolone 0,005 gr.
Colorante, atractivos y bitrex c. s. p. 100 gr.

TERMIXAN® BP es raticida anticoagulante monodósico, a base de Bromadiolone. Posee una excelente palatabilidad, controlando una amplia variedad de roedores. Rápida acción sobre roedores resistentes a warfina. **TERMIXAN® BP** contiene cera siliconizada altamente resistente a condiciones adversas (humedad y temperatura) **TERMIXAN® BP** con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día. La muerte se asemeja a la que se produce por vejez y de este modo sus congéneres no recelan del alimento. **TERMIXAN® BP** presenta una forma de bordes múltiples que resulta atractiva para el roedor por sus hábitos de morder. Los bloques tienen un orificio central que facilita su fijación con mayor seguridad. **TERMIXAN® BP** es un producto, según la OMS, clase toxicológica IV (producto que normalmente no ofrece peligro). **TERMIXAN® BP** para mayor seguridad contiene Bitrex, un disuasivo alimentario para la ingesta involuntaria humana. **TERMIXAN® BP** tiene antídoto: Vitamina K1

Listo para usar

Uso profesional, pecuario y doméstico

Autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) N° P-453/16

Presentación envases de 1 kilo bloques de 10 grs.

Fabricado por: Punch Química S. A.

Importa y Distribuye: Carlos Salas y Cia. Ltda.
Providencia, Santiago – Chile – Teléfono: (2) 2274 4989

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.

PLAGA	APLICACION
RATAS	De 2 a 8 bloques a intervalo de 4 a 9 mt.
RATONES	1 bloque cada 2 a 4 mt.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Conservar **TERMIXAN® BP** en su envase original.
- Usar guantes para su manipulación.
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
- Enterrar o eliminar los roedores muertos y eliminar el cebo no consumido.
- Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.



Raticida Bloques Piramidales

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico **CITUC al fono: 2-2635 3800**, las 24 horas.
- Mantener al afectado abrigado y en reposo Si el afectado está inconsciente, no administrar nada por boca y mantenerlo acostado de lado.

ANTÍDOTO

- Monitoreo de Tiempo de Protrombina (TP) a las 24, 48 y 72 horas. En caso de elevación de Tiempo Protrombina, administrar **Vitamina K 1 (Fitomenadiona oral o inyectable)**

ACCIÓN TÓXICA

- Bromadilone es un anticoagulante. Puede observarse hemorragia nasal o de encías, hematuria, hemorragia gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales y excesiva fragilidad capilar hasta varios días después de ocurrida la ingesta.

- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.**
- **ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.**
- **EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**
- **MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO.**
- **NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.**
- **TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.**

En caso de INTOXICACION, llamar a:

- CITUC (atención las 24 horas): (2) 2635 3800.

Santiago – Chile.

