

Cebo Gel Cucarachicida

Composición

Fipronil	0,05 g.
Atractantes e inertes	100 g.

CUCAXAN® PRO es un cebo gel cucarachicida a base de Fipronil con una exclusiva fórmula altamente palatable, reforzada con feromona de agregación, resultando 100% efectiva contra todo tipo de cucarachas.

CUCAXAN® PRO posee efecto domino, multiplicando el rendimiento del producto.

CUCAXAN® PRO contiene compuestos especiales y aminoácidos esenciales en la dieta de las cucarachas, que lo convierten en un cebo con poder atractivo y muy buena palatabilidad.

CUCAXAN® PRO contiene Bitrex (Benzoato de denatonio), amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso.

Listo para usar

Para Uso Profesional y Doméstico

Autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) N° P- 914/21

Disponible en jeringas de 6 y 30 gr.

Fabricado por: Punch Química S. A.

Importa y Distribuye: Carlos Salas y Cía. Ltda. AGROAMBIENTE®

Teléfono: (562) 2274 4989

Providencia, Santiago – Chile.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.

RECOMENDACIONES DE USO

Para el control de cucarachas como primera medida es importante la higiene del área a tratar.

Una vez complementada la higiene, aplicar **CUCAXAN® PRO** en huecos hendiduras y otros lugares que las cucarachas puedan usar como áreas de refugio, anidando, viviendo y reproduciéndose: bajo de mesones, estanterías, sumideros, fregaderos, rejillas, alrededor de cañerías, cielos falsos, debajo y detrás de cocinas, hornos, refrigeradores, lavadoras, muebles de cocina, basureros, estufas, calefactores, sótanos y en lugares de difícil acceso.

- No aplicar en los lugares que generalmente se ven afectados por una constata limpieza como ser mesas o superficies donde se preparan alimentos.
- No aplicar insecticidas en spray en áreas tratadas con cebo **CUCAXAN® PRO** porque reduce la atraktividad del cebo.

Cebo Gel Cucarachicida

FORMA DE APLICACIÓN

Quitar la tapa al aplicador y presionar levemente para aplicar el producto en forma de puntos individuales sobre las superficies a tratar. Cada punto debe ser de 3 mm. de largo. Por cada 5 gr. equivalen a 100 puntos.

CUCAXAN® PRO no requiere equipos especiales; interrumpir las labores del área a tratar; ni cubrir la zona. No tiene olor, no mancha, no chorrea. La seguridad de su uso lo convierte en el producto ideal para áreas de ingreso restringido como hospitales, colegios, guarderías, geriátricos, panaderías, hoteles, restaurantes, industrias alimenticias, etc.

El siguiente cuadro de recomendaciones debe ser considerado como una guía general.

PLAGA	BAJA INFESTACION	ALTA INFESTACION
Blatella germanica	10 puntos X 10 m ² .	15 a 24 puntos X 10 m ² . cada 3 días.
Periplaneta americana Blatta orientalis	20 puntos X 10 m ² .	20 puntos X 10 m ² . cada 3 días.

Las cucarachas se trasladan entre hogares por distintas vías como ser cables de telefonía o electricidad y cañerías. Verifique bloquear todas las vías de acceso. Si el problema de cucarachas sigue presente deberá recomendar a los vecinos el uso del sistema **CUCAXAN® PRO**.

PRECAUCIONES GENERALES

En caso de intoxicación, llevar esta etiqueta al médico. No beber, no comer ni fumar durante la aplicación del producto. No aplicar sobre alimentos ni animales domésticos. No ingerir ni inhalar. No aplicar sobre vajilla, utensilios de cocina, ni objetos de tocador. No aplicar en superficies en contacto con alimentos. No aplicar en instalaciones con riesgo de cortocircuito. Utilizar solo en lugares de difícil acceso para los niños y los animales.

ALMACENAMIENTO

Mantener en su envase original bien cerrado y fuera del alcance de los niños y animales domésticos, a una temperatura entre 0º y 35º C.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión no inducir al vomito ni introducir nada por la boca a una persona inconsciente.

Trasladar al paciente de forma inmediata a un Centro Asistencial cercano.

En caso de acceder el producto a los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos.

INSTRUCCIONES PARA EL MEDICO

Grupo Químico: Sulfonamidas fluoroalifáticas.

Nombre Común: Sulfluramida.

Antídoto: Tratamiento sintomático.

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.
- EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
- MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO.
- NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.
- TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.

Santiago – Chile.

