

## DESCRIPCIÓN

**TALON® Pellets** es un poderoso raticida anticoagulante de segunda generación, de dosis única, que controla eficazmente ratones o lauchas, ratas del tejado y guarenes, incluso aquellos resistentes a los raticidas de uso común.

**TALON® Pellets** mata a los roedores con la primera dosis que ingieren, equivalente 1,3 grs. en ratas y 0,2 grs. en lauchas, y no produce rechazo al cebo, ya que la muerte de los roedores ocurre a partir del tercer día de la primera ingesta.

**TALON® Pellets** contiene **BITREX®**, amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso y no siendo detectado por los roedores.

## RECOMENDACIONES DE USO

**TALON® Pellets** es un raticida listo para usar, especialmente indicado para el control de roedores en casas, bodegas, edificios, industrias, planteles animales y otros.

- Aplicar **TALON® Pellets** tan pronto se observen las primeras señales de los roedores (ej. fecas, huellas, roeduras, etc).
- En caso de infestación alta, repita la aplicación cada 7 días, hasta que cese el consumo.

El siguiente cuadro de recomendaciones debe ser considerado como una guía general:

ROEDOR	INFESTACIÓN	
	ALTA	BAJA
Ratas	1 bolsitas por punto de cebo (cada 5 mts)	1 bolsita por punto de cebo (cada 10 mts)
Ratones y Lauchas	1 bolsita por punto de cebo (cada 3 mts)	1 bolsita por punto de cebo (cada 8 mts)

- Colocar **TALON® Pellets** donde los roedores viven, circulan o se alimentan.
  - Para ambientes y lugares muy húmedos, prefiera **Talon® Bloques Parafinados**.
- Complementar el uso de **TALON® Pellets** con una correcta limpieza, aseo y desmalezado del lugar.



**LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Consultas al Fono (2) 2941 0100 o al mail: [productos.profesionales@syngenta.com](mailto:productos.profesionales@syngenta.com)

**RATICIDA EN PELLETS**

**PROFESIONAL**

TALON PELLETS 0,005%

**PRODUCTO GOLD**

**COMPOSICIÓN**

Brodifacoum CAS 56073-10-0.....	0,005 g
Bitrex* .....	0,001 g
Derivados de cereales c.s.....	100 g


\* Benzoato de denatonium.

**LISTO PARA USAR EN INTERIOR O LUGARES NO HUMEDOS**



Contenido Neto:

**syngenta**



**PRODUCTO DE BANDA VERDE**  
**Cuidado**

**Grupo químico: Hidroxicumarinas.**

**Clase Toxicológica OMS: IV (Cuidado). Producto de Banda Verde.**

**Condición de venta: Especializada (Uso Profesional)**

**Fabricado por:** Server Química Ltda., Avenida Norberto de Carvalho N° 1473, Vera Cruz, Sao Paulo, Brasil.

**Importado y distribuido por:** Syngenta S.A., Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes, Santiago.

Bajo Licencia de Syngenta Protecao de Cultivos Ltda. Brasil.

**Registro ISP N° P- 723/15**

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

**Bitrex®** es marca registrada de Mac-Farland Smith, Inglaterra.

Codigo de Barra:

Lote / Vencimiento:

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Conservar TALON® en su envase original.
- Usar guantes para su manipulación.
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
- Enterrar o eliminar los roedores muertos y cebo no consumido.
- Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.
- Mantener fuera del alcance de los niños y/o personas no responsables.
- Mantener lejos del alcance de aves y animales.
- No colocar cebo en áreas que están en contacto con alimentos o sean accesibles para niños o animales domésticos.
- No almacenar junto con alimentos o forrajes.
- En caso de envenenamiento llamar a un médico.
- Riesgo Ambiental: Tóxico para peces, crustáceos y aves. No eliminar a cursos o fuentes de aguas.
- Manejo de envases vacíos: Incineración y/o eliminación en instalaciones autorizadas.

### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, **NO** provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico CITUC al fono: (02) 635 3800, las 24 horas.
- **SIGNOS DE INTOXICACIÓN:** después de una ingesta accidental pueden aparecer hasta varios días después hemorragias de intensidad variable.

### ANTIDOTO

- Vitamina K1 (Fitomenadiona) oral o inyectable. Adultos 40 mg /día. Niños: 20 mg /día (ambos en varias dosis hasta que el tiempo de protrombina vuelva a la normalidad).
- **ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER TODA LA ETIQUETA.**
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y/O PERSONAS NO RESPONSABLES.**
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE AVES Y ANIMALES.**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN, MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

### En caso de INTOXICACION, llamar a:

- Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 2635 3800
- Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 2941 0100

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y MASCOTAS**