

Raticida en Bloque

Composición

Brodifacoum CAS 56073-10-0.....	0,005 g
Bitrex*	0,001 g
Derivados de cereales c.s.....	100 g
*Benzoato de Denatonium	

TALON® BLOQUE es un poderoso raticida anticoagulante de segunda generación, de dosis única, que controla eficazmente lauchas, ratas del tejado y guarenes, incluso aquellos resistentes a los rodenticidas de uso común.

TALON® BLOQUE mata a los roedores con la primera dosis que ingieren, equivalente a 1,3 gr. en ratas y 0,2 gr. en lauchas, y no produce rechazo al cebo, ya que la muerte de los roedores ocurre 2 a 5 días después de su ingesta.

TALON® BLOQUE contiene **BITREX®**, amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso y no siendo detectado por los roedores.

Listo para usar en exterior o lugares húmedos

Para Uso Profesional

Autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) N° P-609/16

Disponibile en cuñete de 10 kg.

Fabricado por: Server Química Ltda., Rua Italia 98, Marilia, Sao Paulo, Brasil.
Bajo licencia Syngenta Protectao de Cultivo, Sao Paulo, Brasil.

Importa: Syngenta S.A.
Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes - Teléfono: 2 2941 0100

Distribuye: Carlos Salas y Cía. Ltda. AGROAMBIENTE®
Providencia, Santiago – Chile – Teléfono: 2 2274 4989

®: Marca registrada de Syngenta Limited.

PRODUCTO DE BANDA VERDE Cuidado

APROBACIONES



RECOMENDACIONES DE USO

TALON® BLOQUE encerados es un cebo listo para usar, especialmente indicado para el control de roedores en exterior de casas, bodegas, industrias, planteles animales y otros ya que es altamente resistente a la humedad.

- Aplicar **TALON® BLOQUE** tan pronto se observen las primeras señas de los roedores (ej. fecas, huellas, etc.).
- En caso de una infestación alta, repita la aplicación cada 7 días hasta que cese el consumo.
- Utilizar el orificio central de los bloques para colgarlos o fijarlos (ej. Caja cebadora o tubo de PVC), en todos los lugares donde los roedores circulen, viven y alimenten, como por ej.: alcantarillas; canales de desagües; vigas; jardines; árboles; madrigueras; etc.
- Para prevenir una nueva infestación, se recomienda mantener algunos puntos de cebo permanentes (puntos críticos).

El siguiente cuadro de recomendaciones debe ser considerado como una guía general.

ROEDOR	INFESTACION	
	ALTA	BAJA
Ratas y guarenes	1 a 2 bloques cada 5 m.	1 a 2 bloque cada 10 m.
Ratones y Lauchas	1 bloque cada 3 m.	1 bloque cada 6 m.

- Para interiores o ambientes secos, prefiera **TALON® PELLETS**
 - Complementar el uso de **TALON® BLOQUE** con una correcta limpieza, aseo y desmalezado del lugar
- Grupo químico:** Hidroxicumarina.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Conservar **TALON® BLOQUE** en su envase original.
- Usar guantes para su manipulación.
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
- Enterrar o eliminar los roedores muertos y eliminar el cebo no consumido.
- Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.
- Mantener fuera del alcance de los niños y/o personas no responsables.
- Mantener fuera del alcance de aves y animales.
- No almacenar junto con alimentos.
- En caso de intoxicación acuda a un médico

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, **NO** provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico **CITUC al fono: 2 2635 3800**, las 24 horas.
- **SIGNOS DE INTOXICACION:** después de una ingesta accidental pueden aparecer hasta varios días después hemorragias de intensidad variable.

ANTIDOTO

- Monitoreo de Tiempo de Protrombina (TP) a las 24, 48 y 72 horas. En caso de elevación de Tiempo Protrombina, administrar **Vitamina K 1 (Fitomenadiona oral o inyectable)**.

Adultos 40 mg. x día y Niños menores de 12 años 20 mg. x día, ambos en varias dosis hasta que el tiempo de protrombina vuelva a la normalidad.

- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.**
- **ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.**
- **EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**
- **MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO.**
- **NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.**
- **TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.**

En caso de INTOXICACION, llamar a:

- Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 2635 3800.
- Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 2941 0100,
Santiago – Chile.

